

# 鞋類塑化劑 含量測試

## 長期接觸塑化劑危害健康

市面上不少膠拖鞋的塑化劑含量超標，部份產品更超出324倍，情況令人嘩然

STC曾為不同的膠拖鞋進行塑化劑含量測試，結果顯示一半產品超標，可見問題不容忽視。專家指出，塑化劑可經皮膚吸收，長期接觸塑化劑不但增加致癌風險，更會影響嬰兒成長及其生殖器官。

有見及此，STC現提供一連串的鞋類化學測試，客戶進行有關測試可提高產品質素，加強消費者信心，及確保產品符合相關條例。

### 鞋類化學性能測試項目

測試項目	測試方法
塑化劑含量	Gas Chromatography
偶氮測試	EN 14362-1 and 2
五氯酚測試	DIN 53313
甲醛含量	BS EN ISO 14184 1 & 2
鎳釋放量	BS EN 1811



還有更多測試服務未能盡錄，歡迎向我們的紡織、傢俱及鞋類部職員垂詢：

總部：香港新界大埔工業邨大宏街 10 號

香港新界大埔汀角路57號太平工業中心一座10樓B室

電話：+852 3188 8845 / 3188 8846

傳真：+852 2661 2372

電郵：[tmd@hkstc.org](mailto:tmd@hkstc.org)

網址：[www.stc-group.org](http://www.stc-group.org)

聲明：以上提供的資料是由香港標準及檢定中心有限公司從其認為準確的數據源取得。該數據的分發並沒有附載任何保證、聲明、促使或許可。香港標準及檢定中心有限公司無須就任何使用或依賴該數據而承擔任何法律責任。